

## ¿Qué puedo hacer si existe la posibilidad de que mi hijo tenga pérdida auditiva?

La pérdida auditiva puede afectar la capacidad del niño para desarrollar el habla, el lenguaje y las destrezas sociales. Entre más pronto el niño con pérdida auditiva comience a recibir servicios, mayores serán sus probabilidades de que pueda desarrollar al máximo el habla, el lenguaje y sus habilidades sociales. Los servicios pueden ser administrados en el centro para el desarrollo infantil de su localidad.

Pida al doctor de su hijo que le ayude y le dé información

Pida una cita para que le hagan la prueba de la audición a su hijo.

Llame al centro para el desarrollo infantil en su comunidad.



### Directorio de los centros para el desarrollo infantil de Wyoming:

Afton	885-9286	Glenrock	436-5357	Rawlins	324-9656
Alpine	654-4116	Green River	872-3290	Riverton (0-3)	856-4246
Arapahoe	857-9333	Guernsey	836-2838	Riverton (3-5)	856-4337
Basin	568-2914	Hulett	467-5944	Rock Springs	352-6871
Big Piney	276-5415	Jackson	733-3791	Saratoga	326-5839
Buffalo	684-9271	Kemmerer	877-6984	Sheridan	672-6610
Casper	235-5097	Laramie	742-6374	Shoshone	876-2551
Cheyenne	632-2991	Lander	332-5508	Sundance	282-2526
Cody	527-7784	Lovell	548-6722	Thayne	883-4116
Douglas	358-3901	Lusk	334-2252	Thermopolis	864-9227
Dubois	455-3341	Moorcroft	756-3554	Torrington	532-7068
Evanston	789-7384	Mountain View	782-6601	Upton	468-2200
Ft. Washakie	332-5678	Newcastle	746-4560	Wheatland	322-3385
Gillette	682-2392	Pinedale	367-6306	Worland	347-8677
		Powell	324-9656		

### ¿Quién puede darme más información sobre la pérdida auditiva?

- Wyoming Department of Health  
- Behavioral Health Division - Teléfono: 800-510-0280
- Wyoming EHDI Program - Teléfono: 307-721-6212
- Su doctor
- [www.WyomingEHDI.org](http://www.WyomingEHDI.org)
- [www.babyhearing.org](http://www.babyhearing.org)
- [www.infantheating.org](http://www.infantheating.org)

## Programa de Detección Auditiva e Intervención Tempranas (EHDI), Wyoming



¿Por qué es importante que  
todos los años se le haga a su  
hijo la prueba de la audición?

La pérdida auditiva puede presentarse en cualquier etapa de la vida... desde antes del nacimiento hasta la adultez...

### ¿Qué es la pérdida auditiva en los niños?

La pérdida auditiva puede variar ampliamente de un niño a otro y puede tener muchas causas.

Muchos niños pueden presentar pérdida auditiva temporal leve cuando se acumula líquido en el oído medio a consecuencia de alergias o resfriados. Algunas veces, como resultado de una infección en el oído, se acumula líquido en el oído medio. Esto puede causar pérdida auditiva y retraso en el desarrollo del habla y lenguaje de su hijo.



Algunos niños presentan pérdida auditiva permanente, que puede ir desde moderada (estos niños oyen menos de lo que usted puede oír) hasta profunda (estos niños no pueden oír nada).

### ¿Cuales son algunos de los síntomas de la pérdida auditiva?

Los signos y síntomas de la pérdida auditiva son diferentes en cada niño. Si observa alguno de los siguientes síntomas, consulte al doctor de su hijo, a la enfermera o al centro para el desarrollo infantil de su localidad:

- No voltea la cabeza hacia la fuente del sonido a los 3 ó 4 meses de edad.
- Presta atención a los sonidos producidos por objetos que vibran y se pueden sentir y no a aquellos sonidos que se pueden oír.
- No dice palabras sencillas como “mamá” o “papá” al año de edad.
- Voltea la cabeza para verla a usted, pero no lo hace cuando usted lo llama por su nombre. Este comportamiento con frecuencia se confunde con la falta de atención, pero en realidad puede ser el resultado de una pérdida auditiva parcial.
- Oye algunos sonidos pero no otros.

No es fácil decir si su hijo tiene pérdida auditiva, pues en la mayoría de los casos la pérdida auditiva es parcial. A continuación se da un ejemplo que muestra la capacidad de oír cuando existe una pérdida auditiva:

Audición normal: **Fabio le prestó su chaleco a Sara**

Pérdida auditiva leve: **Fabio le pre-tó -u chaleco a -ara**

Pérdida auditiva moderada: **-abio le pre-tó -u -aleco a -ara**

Pérdida auditiva severa: **-a-io e -e-ó -u -a-e-o a -a-a**

Pérdida auditiva profunda: **FUERTEsuave suaveFUERTE suaveFUERTEsuave FUERTEsuave**

Los siguientes son factores de riesgo frecuentemente asociados a la pérdida auditiva en los bebés y niños. Es posible que a su hijo se le diagnostique pérdida auditiva si son ciertos algunos de estos factores:

- Existen antecedentes de pérdida auditiva infantil en la familia.
- La cabeza, la cara o las orejas se han desarrollado o tienen una forma diferente a lo normal.
- El niño se dio un golpe duro en la cabeza (que necesitó atención médica).
- Ha tenido infecciones de los oídos con acumulación de líquido por más de 4 meses.
- Pasó más de 48 horas en la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos.
- Tiene algún trastorno neurológico que está relacionado con la pérdida de la audición (pregúntele al doctor).
- Estuvo expuesto a alguna infección antes de nacer.
- Ha tenido alguna infección alrededor del cerebro y la médula espinal causada por bacterias (meningitis bacteriana).
- Tuvo una fuerte ictericia (hiperbilirrubinemia) al nacer y fue sometido a un procedimiento especial (transfusión sanguínea).
- Piensa que su hijo tiene problemas para oír.